

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común

Thiabendazole 500 g/L

Nombre Químico

Thiabendazole:
2- (tiazol-4-il) benzimidazol

No. CAS

Número: 148-79-8

FORMULACIÓN

Suspensión Concentrada (SC)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Líquido Blanquecino

Olor: Olor ligero

Densidad: 1.05 g/ml (20 °C)

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

MODO DE ACCIÓN

BONUM® es un fungicida foliar con acción sistémica. Inhibe la división celular, afectando la formación del huso acromático.

MECANISMO DE ACCIÓN

BONUM® impide la mitosis, actuando el ensamblaje de la β -tubulina. BONUM® se une con la β -tubulina inhibiendo la polimerización de los microtúbulos, evitando la formación del huso acromático durante la profase.

RECOMENDACIONES DE USO

Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionada por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de su uso.

MODO DE APLICACIÓN

Aplicar BONUM® en solución con agua de acuerdo al área a tratar. Llenar el tanque o cilindro hasta la mitad de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada de BONUM®, luego complementar con agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

USOS Y DOSIS

Cultivo	Enfermedad		DOSIS (ml/200L)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Fresa	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	200 – 250	14	0.1
Palto	"Muerte regresiva"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	150 - 200	15	15
Arándano	"Muerte regresiva"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	250	62	0.1

P.C.: Período de carencia. L.M.R.: Límite máximo de residuos.

DESINFECCIÓN DE SEMILLAS

Cultivo	Enfermedad		DOSIS (ml/200L)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Papa	"Rizoctoniasis"	<i>Rhizoctonia solani</i>	600 – 800	90	15

PERIODO DE REINGRESO

Utilizar equipo de protección personal las primeras 24 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD

BONUM® puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Excepto con productos agentes oxidantes, agentes cáusticos fuertes y soluciones alcalinas.

PRECAUCIONES

La persona encargada de manipular el producto en el equipo debe utilizar ropa de protección adecuada para ello. Manejar adecuadamente la calibración de equipos y volúmenes de agua para mantener un control eficiente del producto. Seguir las normas de seguridad para la aplicación de productos fitosanitarios para evitar daños al aplicador.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

LIGERAMENTE PELIGROSO

PRESENTACIONES COMERCIALES

Frascos de plástico de 1 L y 20 L.

FORMULADOR

NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD

REGISTRO

Reg. PQUA N° 2611 – SENASA

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

@INTEROC



DIRECCIÓN:

Av. Javier Prado Oeste
2442. Piso 16.
Magdalena del Mar.
Lima Perú

TELÉFONOS:

(511) 614-5100

WEB:

Interoc.biz