

DICARZOL®

Fecha de actualización: junio, 2026

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común

Formetanate hydrochloride 574 g/Kg

Nombre Químico

Formetanate hydrochloride:

[3-(dimethylaminomethylideneamino)phenyl]

N-methylcarbamate; hydrochloride

No. CAS

Formetanate hydrochloride CAS: 23422-53-9

FORMULACIÓN

Polvo Soluble (SP)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Sólido

Olor: Característico

pH a 20 °C: 4

Solubilidad: Insoluble

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

MODO DE ACCIÓN

Dicarzol® es un insecticida que actúa por contacto e ingestión y se utiliza para el control de thrips en espárrago y cebolla.

MECANISMO DE ACCIÓN

Dicarzol® es un insecticida acaricida que actúa como inhibidor de la enzima acetilcolinesterasa, una enzima desactivadora de la neurotransmisora acetilcolina en el sistema nervioso.

RECOMENDACIONES DE USO

Dicarzol® se debe aplicar de manera que forme una cobertura uniforme del área a tratar. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

MODO DE APLICACIÓN

Dicarzol® se emplea por aspersión foliar, y para su aplicación pueden emplearse equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la calibración de los equipos personales 2 (manuales o a motor) previamente se aplica un área definida (100 m), se mide el volumen empleado y, por regla de tres, se lleva al volumen requerido para una hectárea. Para equipos montados se colocan recipientes en cada boquilla y a una velocidad y tiempo definido del tractor (10 km/h, 1 minuto), se mide el volumen aplicado y, también por regla de tres, se lleva al volumen requerido para una hectárea.

USOS Y DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/cil 200L	Kg/Ha		
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.4 - 0.5		14	0.05
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Premnotrypes suturicallus</i>		0.6 - 0.8	8	0.01
Espárrago	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.4 - 0.5		14	0.05
Vid	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>		0.8 - 1.0	92	0.1
Arándano	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>		0.7	107	0.01
Tomate	Caracha o Mosquilla	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.24 - 0.32	0.048	14	0.2

L.M.R.: Límite máximo de residuos.

P.C.: Período de carencia.

COMPATIBILIDAD

Compatibilidad con la mayoría de insecticidas, fungicidas y acaricidas, menos con los productos de reacción alcalina.

PRECAUCIONES

La persona encargada de manipular el producto en el equipo debe utilizar ropa de protección adecuada para ello. Manejar la calibración de equipos y volúmenes de agua adecuados para mantener un control eficiente del producto. Seguir las normas de seguridad para la aplicación de productos fitosanitarios para evitar perjuicios al aplicador.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

ALTAMENTE PELIGROSO

PRESENTACIONES COMERCIALES

Bolsas trilaminadas de: 120 g, 500 g, 1 kg.

FORMULADOR

Gowan Company – Gowan Comercio
Estados Unidos

REGISTRO

Reg. N° PQUA N° 585-SENASA

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

@INTEROC

DIRECCIÓN:

Av. Javier Prado Oeste
2442. Piso 16.
Magdalena del Mar.
Lima Perú

TELÉFONOS:

(511) 614-5100

WEB:

Interoc.biz

@INTEROC

Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER