

INGREDIENTE ACTIVO**Nombre Común**

Bispyribac-sodium 400 g/L

Nombre QuímicoBispyribac-sodium:
sodium 2,6-bis (4,6-dimethoxypyrimidin-2-yloxy)
benzoate**No. CAS**

Bispyribac-sodium CAS: 125401-92-5

FORMULACIÓN

Suspensión Concentrada (SC)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Color: Pálido
Olor: Sin olor
Densidad: 1.10 – 1.20 g/L (20 °C)
pH: 8 - 10
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento
Inflamabilidad: No inflamable
Explosividad: No explosivo

MODO DE ACCIÓN

ECTRAN® es un herbicida selectivo post-emergente de acción sistémica para el control de malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha en arroz, el cual presenta alta efectividad y buena eficacia.

MECANISMO DE ACCIÓN

ECTRAN® actúa inhibiendo la actividad de la enzima acetolactato sintasa (ALS) en las plantas susceptibles; que es una enzima esencial en la biosíntesis de los aminoácidos e inhibe la división celular, detiene el crecimiento, causando clorosis, necrosis y muerte de las plantas.

RECOMENDACIONES DE USO

Para el uso de ECTRAN® es indispensable el uso de un surfactante no iónico para así obtener una buena eficacia en el control de malezas.

Se recomienda el uso de MAXI-COVER® a razón de 100 mL/ha, el cual modifica la tensión superficial, adherencia y por lo tanto da mayor penetración, cobertura y uniformidad del producto sobre el follaje, MAXI-COVER® viene incluido en el PACK comercial del producto. Los mejores resultados se obtienen con aplicaciones de post-emergencia temprana cuando las malezas tienen entre 1 a 3 hojas verdaderas.

DIRECCIÓN:

Av. Javier Prado Oeste
2442. Piso 16.
Magdalena del Mar.
Lima Perú

TELÉFONOS:

(511) 614-5100

WEB:

interoc.biz



Pasión por la innovación

En el momento de realizar la aplicación es necesario que el suelo tenga buena humedad sin lámina de agua. Una vez que ha pasado 48 horas después de aplicado el producto, se recomienda inundar el campo.

MODO DE APLICACIÓN

En la aplicación de herbicidas post-emergentes al cultivo es necesario emplear un volumen de agua suficiente 200 L/ha para cubrir toda la superficie aérea de las malezas. La aplicación debe hacerse en ausencia de lluvias. Para la preparación se debe realizar una premezcla con agua más la dosis de ECTRAN® a fin de diluir el producto. En el tanque de preparación agregue el surfactante en la cantidad de agua recomendada y mezcle, luego añada la premezcla y agite.

USOS Y DOSIS

Cultivo	Malezas		Dosis ml/ha	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico		
Arroz	“Moco de pavo”	<i>Echinochloa crusgalli</i>	100	0.10
	“Grama dulce”	<i>Cynodon dactylon</i>		
	“Coquito o Cabeza de mono”	<i>Cyperus difformis</i>		

L.M.R.: Límite máximo de residuos.

Período de carencia: 60 días (arroz).

COMPATIBILIDAD

ECTRAN® es compatible con la mayoría de insecticidas piretroides, fosforados y carbamatos; para el caso de herbicidas con todos menos con propanil, triclopyr, 2,4-D Ester y los del grupo aril oxifenoxi.

PRECAUCIONES

Leer la etiqueta antes de usar el producto. No inhalar o ingerir el producto.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

No contaminar las aguas durante la aplicación o mediante el lavado de los equipos.

Después de usar el producto realice el triple lavado del envase. No almacenar ni transportar junto a los alimentos.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

LIGERAMENTE PELIGROSO

PRESENTACIONES COMERCIALES

Envases plásticos por 100 mL, 1 L y 200 L
PACK 100 mL de Ectran + 100 mL de Maxi-cover.

FORMULADOR

Ningbo Generic Chemical Co. Ltd. – China.

REGISTRO

PQUA N° 219 – SENASA

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR