

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común

Bicarbonato de potasio 384 g/Kg
Carbonato de potasio 290 g/Kg

Nombre Químico

Bicarbonato de potasio: dipotassium carbonate

Carbonato de potasio: potassium hydrogen carbonate

No. CAS

Carbonato de Potasio CAS: 584 - 08 - 7

Bicarbonato de Potasio CAS: 298 - 14 - 6

FORMULACIÓN

Polvo Soluble (SP)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Sólido
Color: Pardo
Olor: Ligero-Aromático
pH: 9.1 ± 0.5 (20°C)
Densidad relativa: 0.8 g/ml (20°C)
Inflamabilidad: No inflamable
Explosividad: No explosivo

MODO DE ACCIÓN

FLEXITY® es un fungicida biológico de uso agrícola, de acción por contacto y de uso preventivo y curativo, que inhibe el desarrollo del micelio de los hongos.

MECANISMO DE ACCIÓN

FLEXITY® es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos carbonato de potasio y bicarbonato de potasio, inhiben principalmente el crecimiento de hongos patógenos del follaje alterando procesos de regulación de la presión osmótica, ocasionando la destrucción de las paredes celulares del patógeno al interrumpir el equilibrio del ion potasio en la célula fungosa.

RECOMENDACIONES DE USO

Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende asperjar. Colocar en un tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear y adicionar la cantidad de FLEXITY® de acuerdo a la dosis recomendada, agitar y mezclar. Adicionar el resto de agua y asperjar el producto.

MODO DE APLICACIÓN

Para obtener los mejores resultados, se recomienda aplicar sobre las hojas del cultivo, sin que estas estén mojadas previamente. El tratamiento debe realizarse mediante equipos de pulverización manuales o de tractor; mojando bien el cultivo hasta el punto de goteo (es decir que no chorree de la vegetación al suelo).

USOS Y DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis kg/ cil de 200 L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid <i>Vitis vinifera</i>	"Oidiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	0.5 – 0.6	1	N.A.
Arándano <i>Vaccinium corymbosum</i>	"Moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.7 – 0.8	1	N.A.

PC: Período de carencia

N.A.: No aplica

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PERÍODO DE REINGRESO

Se recomienda no ingresar al área tratada, sin el equipo de protección hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

FLEXITY® es compatible con la mayoría de productos fertilizantes o fitosanitarios normalmente utilizados. No es recomendable mezclarlo con productos de acción ácida. Antes de realizar una mezcla es conveniente realizar una pequeña prueba de campo.

PRECAUCIONES

La persona encargada de manipular el producto en el equipo debe utilizar ropa de protección adecuada para ello. Manejar la calibración de equipos y volúmenes de agua adecuados para mantener un control eficiente del producto. Seguir las normas de seguridad para la aplicación de productos fitosanitarios para evitar perjuicios al aplicador.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

PRECAUCIÓN

PRESENTACIONES COMERCIALES

Bolsas trilaminadas de aluminio por 1 Kg, 5 Kg, 25 Kg.

FORMULADOR

BIOFUNGITEK S.L. – España

REGISTRO

Registro N° 085 – SENASA – PBA

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR



UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER

DIRECCIÓN:

Av. Javier Prado Oeste
2442. Piso 16.
Magdalena del Mar.
Lima Perú

TELÉFONOS:

(511) 614-5100

WEB:

Interoc-custer.com



Pasión por la innovación