

INGREDIENTE ACTIVO**Nombre Común:**

Polyoxin-B 500 g/Kg

Nombre Químico:

5-(2-amino-5-O-carbamoyl-2-deoxy-L-xylonamido)-1,5-dideoxy-1-(1,2,3,4-tetrahydro-5-hydroxymethyl-2,4-dioxypyrimidin-1-yl)-β-D-allofuranuronic acid

No. CAS:

19396-06-6

FORMULACIÓN

Gránulos dispersables en agua (WG)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS**Estado físico:** Sólido**Color:** Ligeramente marrón a amarillento**Olor:** Característico**Densidad:** 0.5 – 0.8 g/cm³**pH:** 3 - 7**Estabilidad:** Estable bajo condiciones normales de almacenamiento**Inflamabilidad:** No inflamable**Explosividad:** No explosivo**MODO DE ACCIÓN**

ORBITT® es un fungicida sistémico con acción protectante. Posee una alta penetración y acción de translocación (sistémica), lo que hace que muestre además de su acción curativa, una alta eficacia preventiva en plantas.

MECANISMO DE ACCIÓN

ORBITT® posee un mecanismo de acción diferente a los fungicidas existentes. ORBITT® inhibe la biosíntesis de quitina de la pared celular del hongo, detiene la expansión de lesiones e inhibe la esporulación y germinación de las esporas.

MODO DE APLICACIÓN

Colocar en un cilindro de mezcla la mitad de agua a usar, adicionar la cantidad de ORBITT® de acuerdo a las dosis recomendadas, agitar. Finalmente adicionar el resto de agua y volver a agitar.

USOS Y DOSIS

Cultivo	Enfermedad		Dosis		L.M.R. ppm
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/Ha	Kg/cil	
Vid	"Oidiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	0.10 - 0.25 (*)	-	0.30
	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.25	-	0.30
	"Ácaro"	<i>Colomerus vitis</i>	0.25	-	0.30
Alcachofa	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	0.10 - 0.15	-	0.30
Pimiento	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	0.10 - 0.15	-	0.30
Holantao	"Oidiosis"	<i>Erysiphe betae</i>	0.10 - 0.15	-	0.30
Quinua	"Mildiu"	<i>Peronospora farinosa</i>	-	0.125	0.30
Arándano	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.12 - 0.14	0.30

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos.

Período de carencia: N. D. (vid, holantao, alcachofa, pimiento, quinua), 0 días (arándano).

(*) Considerar un gasto de agua de 1500 L/Ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

ORBITT® se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar, realizar una pre-mezcla y seguidamente vaciar en el tanque de preparación, previamente llenarlo hasta la mitad con agua, luego completar el agua y mover hasta obtener una mezcla homogénea.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas. Se recomienda realizar mezclas preliminares para eliminar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

PRECAUCIONES

No se han observado disturbios en ojos o irritación a la piel, sin embargo al entrar en contacto con el producto lave los ojos con abundante agua y en el caso de la piel lavar con agua y jabón. Si es inhalado lavar la cavidad nasal y enjuagar la boca con agua. En caso de ser ingerido lavar la boca con agua y de ser posible provocar vómito.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

LIGERAMENTE TÓXICO

PRESENTACIONES COMERCIALES

Bolsas trilaminadas por 100 g, 1 kg

FORMULADOR

Ningbo Sunjoy Agrosience Co., Ltd. – China.

REGISTRO

PBUA N° 235-SENASA

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

@INTEROC

DIRECCIÓN:

Av. Javier Prado Oeste
2442. Piso 16.
Magdalena del Mar.
Lima Perú

TELÉFONOS:

(511) 614-5100

WEB:

interoc.biz



Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER