

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común

Spirodiclofen 240 g/L

Nombre Químico:

Spirodiclofen:

3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro-[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2-dimethylbutyrate

No. CAS

Spirodiclofen CAS: 148477-71-8

FORMULACIÓN

Suspensión Concentrada (SC)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Líquido**Color:** Blanco a beige claro**Olor:** Característico**Densidad** 1.08 g/L (20 °C)**pH:** 4.5**Estabilidad:** Estable bajo condiciones normales de almacenamiento**Inflamabilidad:** No inflamable**Explosividad:** No explosivo

MODO DE ACCIÓN

SPIRAL[®] es un acaricida de amplio espectro, actúa por contacto sobre todos los estados de desarrollo de los ácaros, presenta buen efecto residual así como notables efectos de protección.

MECANISMO DE ACCIÓN

SPIRAL[®] actúa principalmente inhibiendo la síntesis de lípidos sobre estadios ninfales y hembras adultas.

SPIRAL[®] afecta también la fertilidad de las hembras adultas inhibiendo la postura de huevos.

SPIRAL[®] es un producto con una alta lipofilia lo cual le permite tener una alta residualidad y una larga persistencia en las hojas.

RECOMENDACIONES DE USO

Se aplica en solución con agua. Llenar el tanque o cilindro hasta la mitad de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada de SPIRAL[®] luego completar con agua y agitar hasta lograr una mezcla homogénea.

Agitar la mezcla antes de llenar los equipos de aplicación.

La solución debe ser usada dentro de las 24 horas de su preparación.

RECOMENDACIONES DE USO

SPIRAL[®] se debe aplicar de manera tal, que se logre una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionadas por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

USOS Y DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis		LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/cil	%	
Palto	"Ácaro"	<i>Oligonychus punicae</i>	40 - 60	-	1.5
Mandarina	"Araña roja de los cítricos"	<i>Panonychus citri</i>	60	-	0.4
	"Acaro del tostado"	<i>Phyllocop -truta oleivora</i>	80 - 100	-	
Vid	"Ácaro"	<i>Colomerus vitis</i>	40 - 50	0.020 - 0.025	2
	"Araña roja"	<i>Tetranychus urticae</i>	-	0.04	

LMR: Límite Máximo de Residuos.

Período de carencia: 14 días (mandarina, vid); 2 días (palto).

COMPATIBILIDAD

SPIRAL[®] es compatible con formulaciones de otros plaguicidas o abonos foliares de uso común, es compatible también con productos de reacción alcalina; sin embargo, se recomienda realizar siempre pruebas de compatibilidad con otros productos antes de su aplicación en campo.

PRECAUCIONES

La persona encargada de manipular el producto en el equipo debe utilizar ropa de protección adecuada para ello. Manejar adecuadamente la calibración de equipos y volúmenes de agua para mantener un control eficiente del producto. Seguir las normas de seguridad para la aplicación de productos fitosanitarios para evitar daños al aplicador.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

LIGERAMENTE PELIGROSO

PRESENTACIONES COMERCIALES

Envases de plástico por 250 mL, 500 mL y 1 L.

FORMULADOR

Agroshine (Hangzhou) Chemicals Co. Ltd. – China.

REGISTRO

PQUA N° 599- SENASA

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

@INTEROC



DIRECCIÓN:

Av. Javier Prado Oeste
2442. Piso 16.
Magdalena del Mar.
Lima Perú

TELÉFONOS:

(511) 614-5100

WEB:

interoc.biz



Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER