

Sponsor MZ

Fecha de actualización: Abril, 2026

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común

Cymoxanil 80 g/Kg + Mancozeb 640 g/Kg

Nombre Químico

Cymoxanil:

1-[(EZ)-2-cyano-2-methoxyiminoacetyl]-3-ethylurea

Mancozeb:

Manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt

No. CAS

Cymoxanil CAS: 57966-95-7

Mancozeb CAS: 8018-01-7

FORMULACIÓN

Polvo Mojable (WP)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Polvo

Color: Azul

Densidad: 0.35 – 0.5 a 18°C

pH: 6.0 – 8.0

Inflamabilidad: No inflamable (sólido)

Explosividad: No explosivo

MODO DE ACCIÓN

SPONSOR® MZ es un fungicida sistémico local y de contacto, de acción preventiva y curativa.

MECANISMO DE ACCIÓN

SPONSOR® MZ está formado por dos ingredientes activos:

Cymoxanil es un fungicida sistémico que afecta la síntesis de ADN y ARN en las células fungosas inhibiendo varios estadios en los hongos.

Mancozeb es un fungicida de contacto de amplio espectro y acción protectante. Actúa sobre las enzimas que contienen grupos sulfhidrilo, interfiriendo varios procesos bioquímicos dentro de las células fúngicas y mitocondrias.

RECOMENDACIONES DE USO

Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionada por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

PRECAUCIONES

La persona encargada de manipular el producto en el equipo debe utilizar ropa de protección adecuada para ello. Manejar adecuadamente la calibración de equipos y volúmenes de agua para mantener un control eficiente del producto. Seguir las normas de seguridad para la aplicación de productos fitosanitarios para evitar daños al aplicador.

MODO DE APLICACIÓN

Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende asperjar. Colocar en un tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, y adicionar la cantidad de **SPONSOR MZ** de acuerdo a la dosis recomendada, se agita y se mezcla. Se adiciona el resto de agua y se asperja el producto.

USOS Y DOSIS

Cultivo	ENFERMEDAD		Dosis Kg/cil. 200L	Dosis Kg/Ha	L.M.R (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Papa	"Rancha"	<i>Phytophthora infestans</i>	1.0	-	0.05 ⁽¹⁾ 0.2 ⁽²⁾
Cebolla	"Mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	-	1.5-2.0	0.05 ⁽¹⁾ 1.5 ⁽²⁾
Vid	"Mildiu"	<i>Plasmopara viticola</i>	-	2-2.5	0.1 ⁽¹⁾ 1.5 ⁽²⁾

P.C.: Período de carencia.

Vid (28 días), Cebolla (7 días) y papa (14 días).

L.M.R.: Límite máximo de residuos.

(1) Cymoxanil (2) Mancozeb

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Papa y Cebolla: aplicar SPONSOR® MZ durante el desarrollo vegetativo del cultivo y cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad, realizar una aplicación por campaña, dos campañas por año.

Vid: Aplicar SPONSOR MZ cuando durante el desarrollo vegetativo del cultivo y cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad, realizar una aplicación por campaña, dos campañas por año.

PERIODO DE REINGRESO

12 horas

COMPATIBILIDAD

SPONSOR® MZ puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

LIGERAMENTE PELIGROSO

PRESENTACIONES COMERCIALES

Bolsas trilaminadas por 500 g, 1 kg y 5 kg.

FORMULADOR

JIANGSU UNITED AGROCHEMICAL Co., LTD.
CHINA.

REGISTRO

Reg. PQUA N° 2738 – SENASA

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

@INTEROC

DIRECCIÓN:

Av. Javier Prado Oeste
2442. Piso 16.
Magdalena del Mar.
Lima Perú

TELÉFONOS:

(511) 614-5100

WEB:

interoc.biz

@INTEROC

Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER