

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común

Fluazinam 500 g/L SC

Nombre Químico

3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-
 α,α,α -trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine

No. CAS

Fluazinam CAS: 79622-59-6

FORMULACIÓN

Suspensión concentrada

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Líquido

Color: Amarillo

Olor: Característico

Densidad 1.1990 g/ml (20 °C)

pH: 5.3

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

MODO DE ACCIÓN

TEMPUS® es un fungicida con acción protectante con buen poder residual y resistencia a la lluvia. También posee una pequeña actividad curativa y sistémica.

MECANISMO DE ACCIÓN

TEMPUS® actúa a nivel de la fosforilación oxidativa mitocondrial, inhibiendo la germinación de las esporas, la penetración de las hifas en el tejido vegetal y el crecimiento y esporulación de los hongos.

MODO DE APLICACIÓN

TEMPUS® se aplica en solución con agua. Llenar el tanque o cilindro hasta la mitad de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada, luego completar con agua y finalmente agitar hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar los equipos de aplicación. La solución debe ser usada dentro de las 24 horas de su preparación.

USOS Y DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis		LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/Cil	L/Ha	
Papa	"Rancha de la papa"	<i>Phytophthora infestans</i>	0.25 – 0.35	0.5 – 0.7	0.05
Arándano	"Moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1 – 1.2	3

LMR: Límite Máximo de Residuos

Periodo de carencia: 7 días (papa), 30 días (arándano)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar TEMPUS (i.a. Fluazinam) una sola aplicación por campaña como máximo. Aplicar cuando se observe la presencia de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO:

Utilizar equipo de protección personal las primeras 12 horas luego de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

TEMPUS® puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Excepto con productos de fuerte reacción alcalina.

PRECAUCIONES

La persona encargada de manipular el producto en el equipo debe utilizar ropa de protección adecuada para ello.

Dentro de un plan de manejo de cultivos, realizar rotación con fungicidas de distinto grupo químico.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

LIGERAMENTE PELIGROSO

PRESENTACIONES COMERCIALES

Frascos de plástico de 500 mL y 1 L

FORMULADOR

INTEROC SA - Ecuador

REGISTRO

PQUA N° 1844- SENASA

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADOR Y

@ INTEROC

DIRECCIÓN:

Av. Javier Prado Oeste
2442. Piso 16.
Magdalena del Mar.
Lima Perú

TELÉFONOS:

(511) 614-5100

WEB:

interoc.biz