

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común

Pyraclostrobin 500 g/Kg

Nombre Químico

Pyraclostrobin:
methyl N-{2-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-
yloxymethyl]phenyl}-(N-methoxy)carbamate

No. CAS

Pyraclostrobin: CAS: 175013-18-0

FORMULACIÓN

Gránulos dispersables (WG)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Sólido
Color: Blanquecino
Olor: No característico
Densidad: 0.36
pH: 6.8
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento
Inflamabilidad: No inflamable
Explosividad: No explosivo

MODO DE ACCIÓN

ADEPT® es un fungicida sistémico con acción protectora y curativa. Es absorbido por las hojas por translocación translaminar y acropétala.

MECANISMO DE ACCIÓN

ADEPT® inhibe la respiración mitocondrial, bloqueando el transporte de electrones desde ubihydroquinone al citocromo c; llevando a la reducción del ATP, cuya energía es esencial para la célula fúngica, inhibiendo de esta forma la germinación de las esporas, el desarrollo del tubo germinativo y la esporulación, otorgando una prolongada persistencia de acción.

RECOMENDACIONES DE USO

ADEPT® se debe aplicar de manera que forme una cobertura uniforme del área a tratar. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

COMPATIBILIDAD

Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Evitar productos de fuerte reacción alcalina. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

DIRECCIÓN:

Av. Javier Prado Oeste
2442. Piso 16.
Magdalena del Mar.
Lima Perú

TELÉFONOS:

(511) 614-5100

WEB:

Interoc.biz



Pasión por la innovación

MODO DE APLICACIÓN

ADEPT® se aplica en solución con agua. Se calcula la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende proteger. Se coloca en el tanque de mezcla la mitad del agua a emplear, se adiciona la cantidad de ADEPT® de acuerdo a la dosis recomendada y se agita. Finalmente se agrega el resto de agua y se agita hasta obtener una mezcla homogénea.

USOS Y DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis		LMR (ppm)
	Nombre	Nombre Científico	Kg/200 L agua	Kg/ha	
Vid	"Oidiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	0.025 - 0.035	-	2
Arándano	"Mancha negra de la hoja"	<i>Alternaria alternata</i>	-	0.25 - 0.30	4
Palto	"Muerte regresiva"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	-	0.5	0.2

L.M.R.: Límite máximo de residuos.

Periodo de carencia:

35 días (vid), 7 días (arándano) y 7 días (palto)

PERÍODO DE REINGRESO

Utilizar equipo de protección personal las primeras 12 horas después de la aplicación.

PRECAUCIONES

La persona encargada de manipular el producto en el equipo debe utilizar ropa de protección adecuada para ello. Manejar la calibración de equipos y volúmenes de agua adecuados para mantener un control eficiente del producto. Seguir las normas de seguridad para la aplicación de productos fitosanitarios para evitar perjuicios al aplicador.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

LIGERAMENTE PELIGROSO

PRESENTACIONES COMERCIALES

Bolsas trilaminadas de aluminio por 100 g, 1 Kg. y 5 Kg.

FORMULADOR

SINOAGRO CHEMICALS CO. LTD.
Room 1705, No.1065, Zhongshan Road (West),
Shanghai, China

REGISTRO

PQUA N° 2360 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

@ INTEROC