

Dicarzol 500 SP

Fecha de actualización: junio, 2026

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común

Formetanate hydrochloride 574 g/Kg

Nombre Químico

Formetanate hydrochloride:

[3-(dimethylaminomethylideneamino)phenyl]

N-methylcarbamate; hydrochloride

No. CAS

Formetanate hydrochloride CAS: 23422-53-9

FORMULACIÓN

Polvo Soluble (SP)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Sólido

Olor: Característico

pH a 20 °C: 4

Solubilidad: Insoluble

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

MODO DE ACCIÓN

Dicarzol® es un insecticida que actúa por contacto e ingestión y se utiliza para el control de thrips en espárrago y cebolla.

MECANISMO DE ACCIÓN

Dicarzol® es un insecticida acaricida que actúa como inhibidor de la enzima acetilcolinesterasa, una enzima desactivadora de la neurotransmisora acetilcolina en el sistema nervioso.

RECOMENDACIONES DE USO

Dicarzol® se debe aplicar de manera que forme una cobertura uniforme del área a tratar. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

MODO DE APLICACIÓN

Dicarzol® se emplea por aspersión foliar, y para su aplicación pueden emplearse equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la calibración de los equipos personales 2 (manuales o a motor) previamente se aplica un área definida (100 m), se mide el volumen empleado y, por regla de tres, se lleva al volumen requerido para una hectárea. Para equipos montados se colocan recipientes en cada boquilla y a una velocidad y tiempo definido del tractor (10 km/h, 1 minuto), se mide el volumen aplicado y, también por regla de tres, se lleva al volumen requerido para una hectárea.

USOS Y DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/ 200L	Kg/Ha		
Espárrago	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.4 - 0.5		14	0.05
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.4 - 0.5		14	0.05
Tomate	Caracha o Mosquilla	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.24 - 0.32	0.48	14	0.2
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Premnotrypes suturicallus</i>		0.6 - 0.8	8	0.01
Arándano	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>		0.7	107	0.01
Vid	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>		0.8 - 1.0	92	0.1

L.M.R.: Límite máximo de residuos.

P.C.: Período de carencia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para los cultivos de espárrago y cebolla, no realizar más de 2 aplicaciones por campaña/año. El intervalo de aplicación es de 14 días o más. Para los cultivos de tomate, papa, arándano y vid se recomienda realizar una aplicación por campaña considerando una campaña al año. Para los cultivos de arándano y vid, SOLO USAR EN BROTIAMIENTO NO APLICAR EN PRESENCIA DE FRUTO.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado por lo menos 48 horas luego de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Compatibilidad con la mayoría de insecticidas, fungicidas y acaricidas, menos con los productos de reacción alcalina.

PRECAUCIONES

La persona encargada de manipular el producto en el equipo debe utilizar ropa de protección adecuada para ello. Manejar la calibración de equipos y volúmenes de agua adecuados para mantener un control eficiente del producto. Seguir las normas de seguridad para la aplicación de productos fitosanitarios para evitar perjuicios al aplicador.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

ALTAMENTE PELIGROSO

PRESENTACIONES COMERCIALES

Bolsas trilaminadas de: 120 g, 500 g, 1 kg.

FORMULADOR

Gowan Company – Gowan Comercio Estados Unidos

REGISTRO

Reg. N° PQUA N° 585-SENASA

TITULAR DE REGISTRO

FSR CONSULTORES E.I.R.L.

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

@INTEROC

DIRECCIÓN:

Av. Javier Prado Oeste
2442. Piso 16.
Magdalena del Mar.
Lima Perú

TELÉFONOS:

(511) 614-5100

WEB:

Interoc.biz



Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER