

INGREDIENTE ACTIVO**Nombre Común**

Bispyribac-sodium 400 g/L

Nombre Químico

Sodium 2,6-bis (4,6-dimethoxypyrimidin-2-yloxy) benzoate

No. CAS

Bispyribac-sodium CAS: 125401-92-5

FORMULACIÓN

Suspensión Concentrada (SC)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS**Estado físico:** Líquido**Color:** Pálido**Olor:** Sin olor**Densidad:** 1.10 – 1.20 g/L (20 °C)**pH:** 8 - 10**Estabilidad:** Estable bajo condiciones normales de almacenamiento**Inflamabilidad:** No inflamable**Explosividad:** No explosivo**MODO DE ACCIÓN**

ECTRAN® es un herbicida selectivo post-emergente de acción sistémica para el control de malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha en arroz, el cual presenta alta efectividad y buena eficacia.

MECANISMO DE ACCIÓN

ECTRAN® actúa inhibiendo la actividad de la enzima acetolactato sintasa (ALS) en las plantas susceptibles; que es una enzima esencial en la biosíntesis de los aminoácidos e inhibe la división celular, detiene el crecimiento, causando clorosis, necrosis y muerte de las plantas.

RECOMENDACIONES DE USO

Para el uso de ECTRAN® es indispensable el uso de un surfactante no iónico para así obtener una buena eficacia en el control de malezas.

Se recomienda el uso de MAXI-COVER® a razón de 100 mL/ha, el cual modifica la tensión superficial, adherencia y por lo tanto da mayor penetración, cobertura y uniformidad del producto sobre el follaje. Los mejores resultados se obtienen con aplicaciones de post-emergencia temprana cuando las malezas tienen entre 1 a 3 hojas verdaderas.

PRECAUCIONES

Leer la etiqueta antes de usar el producto. No inhalar o ingerir el producto.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

No contaminar las aguas durante la aplicación o mediante el lavado de los equipos.

Después de usar el producto realice el triple lavado del envase. No almacenar ni transportar junto a los alimentos.

DIRECCIÓN:

Av. Javier Prado Oeste
2442. Piso 16.
Magdalena del Mar.
Lima Perú

TELÉFONOS:

(511) 614-5100

WEB:

interoc.biz

MODO DE APLICACIÓN

En la aplicación de herbicidas post-emergentes al cultivo es necesario emplear un volumen de agua suficiente 200 L/Ha para cubrir toda la superficie aérea de las malezas.

La aplicación debe hacerse en ausencia de lluvias.

Para la preparación se debe realizar una premezcla con agua más la dosis de ECTRAN® a fin de diluir el producto. En el tanque de preparación agregue el surfactante en la cantidad de agua recomendada y mezcle, luego añada la premezcla y agite.

En el momento de realizar la aplicación es necesario que el suelo tenga buena humedad sin lámina de agua. Una vez que ha pasado 48 horas después de aplicado el producto, se recomienda inundar el campo.

USOS Y DOSIS

Cultivo	Malezas		Dosis	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/Ha	
Arroz	"Moco de pavo"	<i>Echinochloa crusgalli</i>	100	0.10
	"Gramma dulce"	<i>Cynodon dactylon</i>		
	"Coquito o Cabeza de mono"	<i>Cyperus difformis</i>		

L.M.R.: Límite máximo de residuos.

Período de carencia: 60 días (arroz).

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Aplicar el producto a la presencia de las malezas, indicadas en el cuadro de usos, en el campo de cultivo. Emplear dos (02) aplicaciones por campaña como máximo para el cultivo de arroz, considerando dos campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda no ingresar al área tratada, sin equipo de protección, hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

ECTRAN® puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas, excepto con propanil. Sin embargo, se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA**LIGERAMENTE PELIGROSO****PRESENTACIONES COMERCIALES**

Envases plásticos por 100 mL, 1 L y 200 L

FORMULADOR

Ningbo Generic Chemical Co. Ltd. – China.

REGISTRO

PQUA N° 219 – SENASA

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR