

Farmozine

Fecha de actualización: Junio, 2026

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común

Atrazina 500 g/L

Nombre Químico

6-cloro-N-etil-N'-(1-metiletil)-1,3,5-triazina-2,4-diamina

No. CAS

1912-24-9

FORMULACIÓN

Suspensión concentrada (SC)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Líquido

Color: Blanco a gris

Densidad 1.2 g/cm³

pH: 5.5 – 8.5

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

FARMOZINE es un herbicida sistémico y de contacto, tiene la característica de ser absorbido por las raíces y en menor proporción en hojas. Presenta translocación acropétala por el xilema, y se acumula en los tejidos fotosintéticos y puntos meristemáticos.

COMPATIBILIDAD

FARMOZINE es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común a excepción de sustancias fuertemente oxidantes. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

MODO DE APLICACIÓN

Mezclar la dosis recomendada con un poco de agua en un recipiente hasta lograr una suspensión uniforme. Luego, vaciar el contenido en la mochila, cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la cantidad total requerida. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.

La absorción de FARMOZINE puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

USOS Y DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis L/Ha	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico		
Maíz	Capulí cimarrón	<i>Nicandra physalodes</i>	1.0-1.5	0.05
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>		
	Lechera	<i>Euphorbia peplus</i>		
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>		
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>		

L.M.R.: Límite máximo de residuos.

P.C.: Período de carencia: 60 días

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo 01 (una) aplicación por campaña. Aplicar sobre las malezas jóvenes, hasta cuando el cultivo alcance entre 20 y 30 cm de altura.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 12 horas

PRECAUCIONES

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 12 horas.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

LIGERAMENTE PELIGROSO

PRESENTACIONES COMERCIALES

Botellas de plástico de 250 mL y 1 L.

FORMULADOR

Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.

REGISTRO

TITULAR: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C.

REG. PQUA N° 3314-SENASA

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

@INTEROC

DIRECCIÓN:

Av. Javier Prado Oeste
2442. Piso 16.
Magdalena del Mar.
Lima Perú

TELÉFONOS:

(511) 614-5100

WEB:

interoc.biz



Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER