

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común

Metamifop 100g/L

Nombre Químico

Metamifop:

(R)-2-[4-(6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yloxy)phenoxy]-2'-fluoro-N-methylpropionanilide

No. CAS

Número: 256412-89-2

FORMULACIÓN

Concentrado emulsionable (EC)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Líquido

Olor: Marrón ligero

Densidad: 1.06± 0.05 g/ml (20 °C)

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

MODO DE ACCIÓN

GOLEM® es un herbicida selectivo para el cultivo de arroz, con acción sistémica. Inhibe la síntesis de ácidos grasos.

MECANISMO DE ACCIÓN

GOLEM® es un herbicida inhibidor de la síntesis de los ácidos grasos, por la inhibición de la enzima acetil CoA carboxilasa (ACC asa), enzima plasmática que cataliza el primer paso en la biosíntesis de ácidos grasos, componentes esenciales para la producción de lípidos.

RECOMENDACIONES DE USO

Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionada por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de su uso.

COMPATIBILIDAD

GOLEM® puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Excepto con productos agentes oxidantes, agentes cáusticos fuertes y soluciones alcalinas. Se recomienda hacer pruebas en campo para nuevas mezclas.

MODO DE APLICACIÓN

Aplicar GOLEM® en solución con agua de acuerdo al área a tratar. Llenar el tanque o cilindro hasta la mitad de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada de GOLEM®, luego complementar con agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

USOS Y DOSIS

Cultivo	Enfermedad		Dosis L/200L
	Nombre Común	Nombre Científico	
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Gramma mazorquilla	<i>Ischaemum rugosum</i>	1.25 - 1.5
	Cebadilla	<i>Echinochloa colona</i>	
	Moco de pavo	<i>Echinochloa cruz-galli</i>	
	Gramma mazorquilla	<i>Ischaemum rugosum</i>	
	Gramma	<i>Leptochloa uninervia</i>	

P.C.: Período de carencia = 52 días

L.M.R.: Límite máximo de residuos = 0.01 ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una aplicación por campaña, dos campañas al año durante el desarrollo vegetativo del cultivo y etapa post emergente de la maleza.

PERÍODO DE REINGRESO

Utilizar equipo de protección personal las primeras 24 horas después de la aplicación

PRECAUCIONES

La persona encargada de manipular el producto en el equipo debe utilizar ropa de protección adecuada para ello. Manejar adecuadamente la calibración de equipos y volúmenes de agua para mantener un control eficiente del producto. Seguir las normas de seguridad para la aplicación de productos fitosanitarios para evitar daños al aplicador.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

MODERADAMENTE PELIGROSO

PRESENTACIONES COMERCIALES

Frascos de plástico de 1 L y 5L.

FORMULADOR

Jiangsu United Agrochemical Co., Ltd.

REGISTRO

Reg. PQUA N° 2871 – SENASA

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

@INTEROC

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER

DIRECCIÓN:

Av. Javier Prado Oeste
2442. Piso 16.
Magdalena del Mar.
Lima Perú

TELÉFONOS:

(511) 614-5100

WEB:

interoc.biz



Pasión por la innovación

