

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común

Tolfenpyrad 150 g/L SC

Nombre Químico

Tolfenpyrad:
4-chloro-3-ethyl-1-methyl-N-[4-(p-tolyloxy)benzyl]
pyrazole-5-carboxamide.

No. CAS

Tolfenpyrad CAS: 129558-76-5

FORMULACIÓN

Suspensión Concentrada (SC)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Líquido en suspensión
Color: Blanquecino
Olor: Ligero olor
Densidad: 1.10 g/cm³ (20 °C)
pH: 7.0 – 9.0
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento
Inflamabilidad: No inflamable
Explosividad: No explosivo

MODO DE ACCIÓN

LEKKER® es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Posee acción translaminar del haz al envés de la hoja. La acción de control es inmediata y se observa en la inmovilización de la plaga, afectando su alimentación y reproducción, ocasionando su muerte.

MECANISMO DE ACCIÓN

LEKKER® es un insecticida que bloquea la respiración celular, inhibiendo el transporte de electrones en el complejo I mitocondrial; por lo que evita la reacción de oxidación-reducción en la cadena de transporte de electrones. Finalmente se corta la producción del ATP, inmovilizando al insecto.

RECOMENDACIONES DE USO

Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionada por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de su uso.

COMPATIBILIDAD

LEKKER® puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Excepto con producto cáustico, ácido y agente oxidante.

MODO DE APLICACIÓN

Aplicar el producto mediante aspersión directa sobre el follaje de las plantas con una bomba de fumigar de mochila manual.

Calcule la cantidad de agua a emplear de acuerdo a la superficie a proteger. Ponga en el tanque de mezcla la mitad del agua, adicione LEKKER® de acuerdo a la dosis recomendada y agite. Agregue el resto de agua.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200 L agua	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.50	14	0.09
Pimiento	Caracha	<i>Prodidiplosis longifila</i>	0.50 – 0.60	7	1.5
Arándano	Trips	<i>Frankliniella occidentalis</i>	0.25 – 0.30	1	7
Vid	Trips	<i>Frankliniella occidentalis</i>	0.20 – 0.25	1	2

L.M.R.: Límite máximo de residuos.

P.C.: Período de carencia: cebolla (14 días), pimiento (7 días), arándano (1 día) y vid (1 día).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar 1 aplicación por campaña como máximo, durante el crecimiento vegetativo del cultivo, cuando se observe la presencia de la plaga en campo; adicionalmente; en el cultivo de pimiento aplicar durante la fructificación.

PERIODO DE REINGRESO

Utilizar equipo de protección personal las primeras 24 horas luego de la aplicación.

PRECAUCIONES

La persona encargada de manipular el producto en el equipo debe utilizar ropa de protección adecuada para ello. Manejar la calibración de equipos y volúmenes de agua adecuados para mantener un control eficiente del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

MODERADAMENTE PELIGROSO

PRESENTACIONES COMERCIALES

Frascos de plástico: 1 L, 5 L y 20 L.

FORMULADOR

Ningbo Sunjoy Agrosience Co., Ltd

REGISTRO

Reg. PQUA N° 2888 – SENASA

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

@INTEROC

DIRECCIÓN:

Av. Javier Prado Oeste
2442. Piso 16.
Magdalena del Mar.
Lima Perú

TELÉFONOS:

(511) 614-5100

WEB:

interoc.biz