

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común

Cyromazine 225 g/Kg, Eamectin benzoate 100g/Kg

Nombre Químico

Cyromazine:

N – cyclopropyl – 1,3,5 – triazine – 2,4,6 – triamine

Eamectin benzoate: Eamectin B1A Benzoate

No. CAS

Cyromazine

CAS: 66215-27-8

Eamectin benzoate

CAS: 155569-91-8

FORMULACIÓN

Polvo Mojable (WP)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Polvo

Color: Ligeramente amarillo

Densidad: 0.3 – 0.6 g/ml

pH: 5.0 – 8.0

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

MODO DE ACCIÓN

LUPPO® está formado por dos ingredientes activos:

Cyromazine es un insecticida que inhibe el crecimiento y desarrollo de los insectos.

Eamectin benzoate es un insecticida no sistémico que actúa alterando el flujo de iones cloro en los receptores de GABA y H-Glutamato, inhibiendo la contracción muscular en los insectos.

MECANISMO DE ACCIÓN

LUPPO® está formado por dos ingredientes activos:

Cyromazine es un insecticida, regulador de crecimiento, de acción de contacto y en las plantas tienen acción sistémica y translaminar, siendo usado para el control de dípteros.

Eamectin benzoate Insecticida no sistémico que penetra los tejidos de las hojas por movimiento translaminar. Paraliza a los lepidópteros, las cuales dejan de alimentarse después de aplicado el tratamiento.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar LUPPO cuando durante el desarrollo vegetativo del cultivo y cuando se observe la presencia de la plaga, realizar una aplicación por campaña, una campaña por año.

MODO DE APLICACIÓN

Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende asperjar. Colocar en un tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, y adicionar la cantidad de LUPPO® de acuerdo a la dosis recomendada, se agita y se mezcla. Se adiciona el resto de agua y se asperja el producto.

USOS Y DOSIS

Cultivo	ENFERMEDAD		Dosis Kg/cil. 200 L	P.C.	L.M.R (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Papa	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza hiudobrensis</i>	0.6	21	0.01 ⁽¹⁾ 0.05 ⁽²⁾

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos.

(1) Eamectin benzoate (2) Cyromazine

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

LUPPO® puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

PRECAUCIONES

La persona encargada de manipular el producto en el equipo debe utilizar ropa de protección adecuada para ello. Manejar adecuadamente la calibración de equipos y volúmenes de agua para mantener un control eficiente del producto. Seguir las normas de seguridad para la aplicación de productos fitosanitarios para evitar daños al aplicador.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

MODERADAMENTE PELIGROSO

PRESENTACIONES COMERCIALES

Bolsas trilaminadas por 1 Kg y 5Kg.

FORMULADOR

Nanjing Landscape Agrosience Ltd.-China.

REGISTRO

Reg. PQUA N° 2793 – SENASA

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

@INTEROC

DIRECCIÓN:

Av. Javier Prado Oeste
2442. Piso 16.
Magdalena del Mar.
Lima Perú

TELÉFONOS:

(511) 614-5100

WEB:

interoc.biz