

GUÍA FITOSANITARIA

CULTIVO DE ARÁNDANO



	Brotamiento	Floración	Caída de pétalo	Crecimiento de fruto	Maduración
PLAGAS		Verzys (Heliothis virescens) Dosis: 0.080 - 0.090 kg/Cil			
	Lekker® (Trips) Dosis: 0.25-0.30 L/200L de agua		Grandevo® (Cochinilla harinosa) Dosis: 2.5 - 3.0 Kg/Ha		
	ACTUP® (Trips) Dosis: 200-250 g/cil		Stargus® (Oidium) Dosis: 2.5-3lt/ha		
	Adept® (Alternaria sp) Dosis: 0.25 - 0.30 Kg/Ha		Nyctea® (Trips / Chanchito blanco) Dosis: 0.5 -0.6 / 0.6-0.7 L/200L agua		
	CHEKKER® (Mancha negra de la hoja) Dosis: 0.23 - 0.25 Kg/Ha				
ENFERMEDADES	Bonum® (Muerte regresiva) Dosis: 250ml/200L		Flexity® (Botrytis) Dosis: 0.7 - 0.8 Kg/Cil		
		Rimethan® (Botrytis) 150 ml/Cil	Orbitt® (Botrytis) Dosis: 0.12 - 0.14 Kg/Cil		
		TEMPUS (Botrytis) 1 - 1.2 L/Cil	Crossbow® (Podredumbre gris) Dosis: 0.6 - 0.8 kg/ha		
	Basfoliar® Size SL Eklonia máxima Dosis: 1 - 2.5 L/Ha		Colonum® (Oidiosis) Dosis: 3.5 - 4.0 L/Ha		
		BOMBARDIER® (Aminoácidos libres) Dosis: 3 - 5 L/Ha			
	Ryzovol® (Potenciador radicular) Dosis: de 2 a 5 L/Ha				
BIOESTIMULANTES					

Se recomienda usar **maxi-cover** de acuerdo a la necesidad en todas las aplicaciones.

